

Verordnung

Tierarztpraxis
Name, Anschrift

(Stempel)

für Tierhalter

Name: _____

Straße/ Hausnummer _____

PLZ/ Ort _____

Katze:		
Name:	Gewicht in kg:	Alter in Jahren:

Rezepturzubereitung von GS441524 zur Behandlung feliner infektiöser Peritonitis (FIP)	Menge
<p>Orale Paste</p> <p>MHD 6 Monate erhältlich in 200 und 400 Klicks für Katzen bis 4 kg (Konzentration 3,75 mg/Klick) für Katzen ab 4 kg (Konzentration 7,50 mg/Klick)</p> <p>(200 Klicks Packungen als Zusatz-/ Nachbestellung) (400 Klicks Packungen reichen für 30 Tage)</p>	<p>Katzen bis 4 kg (3,75 mg/Klick) 200 Click Packung <input type="radio"/> 400 Click Packung für 30 Tage <input type="radio"/></p> <p>Katzen ab 4 kg (7,5 mg/Klick) 200 Click Packung <input type="radio"/> 400 Click Packung für 30 Tage <input type="radio"/></p> <p>Aroma: <i>Fisch</i> <input type="radio"/> <i>Hühnchen</i> <input type="radio"/></p>
<p>Trinksuspension</p> <p>MHD 12 Monate konzentriert auf 50 mg/ml - erhältlich von 10 bis 100 ml (in Schritten von 10 ml)</p>	<p>_____ ml</p> <p>Aroma: <i>Fisch</i> <input type="radio"/> <i>Hühnchen</i> <input type="radio"/> <i>Rind</i> <input type="radio"/> <i>Garnele</i> <input type="radio"/> <i>Speck</i> <input type="radio"/> <i>Leber</i> <input type="radio"/></p>
<p>Kapseln</p> <p>erhältlich als 10 / 20 / 50 / 100 mg zu je 10 Kapseln</p> <p>MHD 3 Monate</p>	<p>_____ Packungen à 10 Stk. zu _____ mg</p> <p>_____ Packungen à 10 Stk. zu _____ mg</p> <p>Aroma: <i>Fisch</i> <input type="radio"/> <i>Hühnchen</i> <input type="radio"/></p>

FIP-Typ: mit / ohne neurologische und/oder okuläre Symptome - **Dosierung** _____ mg/kg/Tag

Verabreichung:

Bei oraler Paste: Klicks pro Tag während Tagen (bei Gewichtsveränderung anpassen)

Bei Trinksuspension: Milliliter pro Tag während Tagen (bei Gewichtsveränderung anpassen).

Bei Kapseln: Kapseln mit Konzentration und Kapseln mit Konzentration
pro Tag während Tagen (bei Gewichtsveränderung anpassen).

Zusätzliche Anordnung: _____

Datum der Verordnung _____

Unterschrift des Tierarztes

Empfohlene Dosierungen:

15 mg/kg/Tag während 84 Tagen für FIP-Formen ohne neurologische und/oder okuläre Symptome

20 - 22,5 mg/kg/Tag während 84 Tagen für FIP-Formen mit neurologischen und/oder okulären Symptomen.